

# インフルエンザ予防接種 予診票

年 月 日	診察前の体温	度 分	ナビタスクリニック立川		
住 所			生年月日	年 月 日	(満 歳 ヶ月)
ふりがな 受ける人の氏名		男・女	0.25	0.5	L・R
電 話 番 号			LOT NO.		

予防接種の効果や目的、副反応の可能性などについて理解しました。

ワクチン接種を希望します。 **本人(未成年者は保護者の)署名** \_\_\_\_\_

質問事項	回答欄		医師記入欄
2週間以内に予防接種を受けましたか 予防接種名( ) 日付( 年 月 日)	はい	いいえ	
今日受けられるインフルエンザの予防接種は今シーズン何回目ですか 【2回目の方】 前回の接種は 年 月 日	1回目	2回目	
インフルエンザワクチンを受けたことがありますか(去年・ 年 月)	はい	いいえ	
その際に具合が悪くなったことはありますか( )	ある	ない	
インフルエンザ以外の予防接種で具合が悪くなったことはありますか (予防接種名 )	ある	ない	
今日、体に具合の悪いとことがありますか( )	ある	ない	
現在、何かの病気で医師にかかっていますか(病名 )	はい	いいえ	
最近1カ月以内に病気にかかりましたか(病名 )	はい	いいえ	
今までに特別な病気(先天性異常、心臓、腎臓、肝臓、血液、脳神経、免疫不全症、悪性腫瘍、その他病気)にかかり、医師の診断を受けたことがありますか	ある	ない	
【あるの場合】(病名 ) その病気を見ている医師に予防接種を受けていいといわれていますか	いいえ	はい	
今までに間質性肺炎や気管支喘息等の呼吸器系疾患と診断されたことがありますか(病名 )	ある	ない	
けいれん(ひきつけ)を起こしたことがありますか( 歳頃)	ある	ない	
【あるの場合】 その時熱はでましたか	はい	いいえ	
薬や食品(鶏卵・鶏肉等)で発疹や蕁麻疹が出たり、体の具合が悪くなったことがありますか(薬/食品名 )	ある	ない	
近親者で予防接種を受けて具合が悪くなったことがある方はいますか	いる	いない	
【ご婦人の方に】 現在、妊娠していますか	はい	いいえ	
その他、健康状態のことで医師に伝えておきたいことがあれば具体的にご記入ください			

医師記入欄：問診および診察の結果、今日の予防接種は ( 可能 ・ 見合わせる )

医師の署名又は記名押印 \_\_\_\_\_

# インフルエンザワクチンの接種を受けられる方へ

## 〈ワクチンの効果と副反応〉

ワクチンの接種により、インフルエンザの発症を予防したり、たとえ発症しても症状が軽くすみます。そのため、インフルエンザによる重症化や死亡を予防する効果が期待されます。

副反応としては、まれにワクチンの接種直後から数日中に、発疹、じんましん、湿疹、紅斑、多形紅斑、かゆみ、血管浮腫などがあらわれることがあります。全身症状として、発熱、悪寒、頭痛、倦怠感、一過性の意識消失、めまい、リンパ節腫脹、嘔吐・嘔気、腹痛、下痢、食欲減退、関節痛、筋肉痛、咳嗽、動悸、筋力低下など、また局所症状として接種部位に発赤、腫脹、硬結、熱感、疼痛、しびれ感、小水疱などが認められることがありますが、いずれも通常2～3日で消失します。蜂巣炎（細菌による化膿性炎症）、顔面神経麻痺などの麻痺、末梢性ニューロパチー、失神・血管迷走神経反応、しびれ感、振戦、ぶどう膜炎があらわれることがあります。非常にまれですが、次のような重大な副反応がみられることがあります。(1)ショック、アナフィラキシー（じんましん、呼吸困難、血管浮腫など）、(2)急性散在性脳脊髄炎（接種後数日から2週間以内の発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害など）、(3)脳炎・脳症、脊髄炎、視神経炎、(4)ギラン・バレー症候群（両手足のしびれ、歩行障害など）、(5)けいれん（熱性けいれんを含む）、(6)肝機能障害、黄疸、(7)喘息発作、(8)血小板減少性紫斑病、血小板減少、(9)血管炎（IgA血管炎、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、白血球破砕性血管炎など）、(10)間質性肺炎、(11)皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）、急性汎発性発疹性膿疱症、(12)ネフローゼ症候群。なお、副反応による健康被害が生じた場合の救済については、健康被害を受けた人または家族が独立行政法人 医薬品医療機器総合機構法に基づいて手続きを行うことになります。

## 〈予防接種を受けることができない人〉

- ① 明らかに発熱のある人（37.5℃以上）
- ② 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
- ③ 過去にインフルエンザワクチンに含まれる成分で、アナフィラキシーを起こしたことがある人（他の医薬品投与でアナフィラキシーを起こしたことがある人は、予防接種を受ける前にお医者さんへその旨を伝え、判断を仰いでください）
- ④ その他、お医者さんが予防接種を受けることが不相当と判断した人

## 〈予防接種を受ける際に、お医者さんとよく相談しなくてはならない人〉

- ① 発育が遅く、お医者さんや保健師さんの指導を継続して受けている人
- ② カゼなどのひきはじめと思われる人
- ③ 心臓病、腎臓病、肝臓病、血液の病気などの基礎疾患がある人
- ④ 前回の予防接種を受けたときに、2日以内に発熱、発疹、じんましんなどのアレルギーを疑う症状がみられた人
- ⑤ 今までにけいれんを起こしたことがある人
- ⑥ 過去に免疫不全と診断されたことがある人および近親者に先天性免疫不全症の人がいる人
- ⑦ 間質性肺炎、気管支喘息などの呼吸器系疾患のある人
- ⑧ 薬の投与または食事（鶏卵、鶏肉など）で皮膚に発疹が出たり、体に異常をきたしたことがある人
- ⑨ 妊娠の可能性のある人

## 〈予防接種を受けたあとの注意〉

- ① 接種後30分間は病院にいるなどして様子を観察し、アレルギー反応などがあればお医者さんとすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。
- ② 接種当日の入浴は差し支えありませんが、注射した部位をこすことはやめましょう。
- ③ 接種当日は接種部位を清潔に保ち、いつも通りの生活をしましょう。ただし、はげしい運動や大量の飲酒は避けましょう。
- ④ 高熱やけいれんなどの異常な症状が出た場合は、速やかにお医者さんの診察を受けてください。

あなたの接種予定日		医療機関名
月	日( )です	
当日は受付に		
時	分頃おこしてください	